


# BOLETÍN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

*Publicado mensualmente por la Oficina Sanitaria Panamericana*

*AVISO.—Aunque por de contado se despliega el mayor cuidado en la selección de los trabajos publicados in toto o compendiados en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, se sobreentiende que sólo los autores son solidarios de las opiniones expresadas, a menos que se haga constar explícitamente lo contrario.*



Año 7

DICIEMBRE DE 1928

No. 12

## La Sanidad en Venezuela \*

La estabilidad política y adelanto económico de Venezuela en los últimos años han mejorado en general la sanidad en el país. Se ha adelantado mucho en lo tocante a obras públicas y pavimentación de las calles, abastecimientos de agua, y sistemas de alcantarillado. Las pautas de la vida en las masas también han mejorado, al hacerse cumplir medidas higiénicas acerca de la venta de los productos alimenticios, disposición de las inmundicias, y propagación del mosquito. En las principales poblaciones las calles son mantenidas limpias, y los reglamentos vigentes exigen que todas las casas cuenten con baños y retretes. El abastecimiento de agua de Caracas procede de buenas fuentes en las montañas cercanas, pero todavía resta alguna contaminación, que se trata de impedir instalando nuevas alcantarillas. El Gobierno publica frecuentemente avisos relativos a la necesidad de esterilizar toda el agua antes de consumirla. No se han instalado todavía métodos de purificación, pero el Gobierno estudia el problema. Caracas está naturalmente bien desaguada, y se han instalado albañales en la mayor parte de la población en los últimos años. Situada a una altura de unos 1,000 metros sobre el nivel del mar, Caracas goza de un clima apacible, pero el saneamiento no parece impedir que en la región alta existan siempre numerosos casos de paludismo, aunque la mayor parte pasan por originarse en los puntos más bajos. Hay ciertas discrepancias de opinión en cuanto a si existen anófeles a dicha altura, pues en ciertos puntos de la ciudad y de los suburbios abundan los mosquitos, si bien se afirma que no se han podido encontrar anófeles allí. Las enfermedades más reinantes entre los caraqueños son principalmente pulmonares, bronquiales e intestinales. En muchos sitios bajos el paludismo siempre existe, frecuentemente en forma epidémica. El problema

\* Información recopilada por el Departamento del Comercio de los Estados Unidos.

de las viviendas ha creado últimamente algunas preocupaciones. El alcoholismo constituye otro problema. No ha habido epidemias de peste bubónica desde 1919, aunque se han comunicado algunos casos fuera de la ciudad en el año actual. El departamento de sanidad ha implantado medidas contra las ratas en la mayoría de las casas y el mercado público.

Se observará por las estadísticas siguientes, compiladas por el Ministerio de Fomento, que Caracas tuvo en 1927 una mortalidad mayor que Maracaibo, que pasa por ser más malsana. La mortalidad por mil en las diversas partes de la República fué esta: Carabobo (147,204 habitantes), 27.3; Miranda (189,572), 24.6; Portuguesa (58,721), 24.3; Trujillo (218,780), 23.4; Lara (271,369), 22.5; Aragua (105,839), 22.4; Yaracuy (122,836) 22.2; Distrito Federal, incluso Caracas (195,460), 21.9; Anzoategui (129,791), 21.1; Tachira (172,900), 20.9; Zulia (222,613), 20.7; Guarico (125,282), 20.4; Mérida (150,128), 18.3; Sucre (216,476), 17.3; Zamora (57,341), 16.1; Nueva Esparta (69,392), 14.3; Falcón (178,642), 13.5; Apure (58,499), 13.2; Cojedes (82,152) 12.9; Monagas (68,765), 12; Bolívar (98,258), 10.

Venezuela tiene una población estimada en 3,026,878 habitantes, y durante el año 1927 hubo 14,242 casamientos registrados, 90,745 nacimientos y 58,876 muertes. La densidad de población por kilómetro cuadrado varía de 101.27 en Caracas, a 54.64 en Nueva Esparta, 33.68 en Carabobo, 29.56 en Trujillo, 23.84 en Miranda, 18.34 en Sucre, 18.09 en Aragua, 17.30 en Yaracuy, 15.57 en Tachira, 13.71 en Lara, 13.28 en Mérida, 7.20 en Falcón, 5.55 en Cojedes, 3.86 en Portuguesa, 3.39 en Zulia, 2.99 en Anzoategui, 2.43 en Monagas, 1.88 en Guarico, 1.62 Zamora, 0.76 en Apure, 0.66 en el Delta Amacuro, 0.41 en Bolívar, y 0.21 en Amazonas.

Las estadísticas demográficas oficiales sólo se remontan al año 1924. Durante el año 1926 hubo 17,334 casamientos registrados, 91,648 nacimientos y 66,092 muertes. Durante el año 1925 hubo 11,556 casamientos registrados, 95,741 nacimientos y 51,782 muertes. La mortalidad infantil (hasta la edad de un año) alcanzó 837 muertes en 1924, 923 en 1925, 855 en 1926 y 868 en 1927. Las enfermedades que produjeron más de 1,000 muertes en el año 1927 fueron: paludismo 7,299; tuberculosis, 3,439; diarrea infantil (menos de 2 años), 2,826; neumonía, 2,426; influenza, 2,244; tétano infantil, 1,818; disentería, 1,800; parásitos intestinales, 1,659; diarrea (más de 2 años), 1,493; cardiopatías orgánicas, 1,339; abortos, 1,022.

---

*Estudiantes de medicina en Chile.*—El número de estudiantes de medicina en Chile en 1928 es de 1,038, o sea 20 por ciento del total, lo cual representa el segundo puesto en la matrícula, correspondiendo el primero a las ciencias jurídicas y sociales (24 por ciento), el cuarto a la farmacia (10 por ciento) y el quinto a la odontología (7 por ciento). De los estudiantes de medicina, 813 se hallan matriculados en la Universidad de Santiago y 125 en la de Concepción.